

Nelle successive pagine sono elencati i principali Paesi extraeuropei e gli eventuali periodi di sospensione da applicare dopo un soggiorno. In caso di situazioni epidemiologiche particolari (ad esempio focolai di malattie infettive) sono previste sospensioni conformi alla situazione epidemiologica relativa al soggiorno in Paesi o aree come da segnalazione del CNS (Centro Nazionale Sangue). Dopo un viaggio è necessario valutare attentamente lo stato di salute del donatore/aspirante donatore ed eventuali episodi febbrili dopo il rientro.

Di seguito una breve spiegazione delle voci presenti in tabella.

#### **Paese con aree ad endemia malarica**

**6 mesi di sospensione**

Il donatore è idoneo a tutti i tipi di donazione dopo 6 mesi dal rientro se non ha sofferto di episodi febbrili o di altra sintomatologia compatibile con la diagnosi di malaria durante il soggiorno o nei 6 mesi successivi al rientro e se risulta negativo a un test immunologico per la ricerca di anticorpi antimalarici eseguito dopo 6 mesi dal rientro.

Se il donatore non effettua il test e non ha sofferto di episodi febbrili o di altra sintomatologia compatibile con la diagnosi di malaria durante il soggiorno o nei 6 mesi successivi al rientro è idoneo:

1 - solamente alla donazione di plasma da avviare alla produzione industriale di farmaci emoderivati dopo 6 mesi dal rientro;

2 - a tutti i tipi di donazione dopo 12 mesi dal rientro.

#### **Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica**

**6 mesi di sospensione**

Sospensione di 6 mesi dalle donazioni di sangue ed emocomponenti. Idoneo dopo 6 mesi dal rientro a tutti i tipi di donazione.

Valutare lo stato di salute del donatore con particolare attenzione ad episodi febbrili dopo il rientro e le condizioni igienico-sanitarie ed epidemiologiche della zona visitata.

#### **Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica**

**6 mesi di sospensione**

Soggetti che hanno viaggiato in aree a rischio (rurali) e soggiornato in condizioni favorevoli alla malattia di Chagas (camping, trekking): possono essere ammessi alla donazione solo in presenza di un test per anticorpi Anti Trypanosoma cruzi negativo, eseguito dopo 6 mesi dal rientro.

# VADEMECUM DEL DONATORE - VIAGGIATORE

	Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
<b>A</b>	Afghanistan		X			
	Algeria		X			
	Angola		X			
	Arabia Saudita		X			
	Argentina		X		X	
	Armenia	X				
	Atollo Johnson (USA)			X		
	Australia			X		
	Azerbajgian		X			
<b>B</b>	Bahrain	X				
	Bangladesh		X			
	Belize		X		X	
	Benin		X			
	Bermuda (GB)	X				
	Bhutan		X			
	Birmania (Myanmar)		X			
	Bolivia		X		X	
	Botswana		X			
	Brasile		X		X	
	Brunei			X		
	Burkina Faso		X			
	Burundi		X			
<b>C</b>	Cambogia		X			

Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica. 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
Camerun		X			
Canada	X				No sospensione se disponibile test WNV.
Capo Verde		Vedi note	X		Rischio malarico solo nell'isola Sao Tiago / Boavista.
Caraibi (Anguilla - GB, Antigua, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Cuba, Dominica, Guadaloupe, Grenada, Isole Cayman - GB, Isole Vergini - GB, Isole Vergini - USA, Martinica - FR, Montserrat - GB, Porto Rico - USA, St. Barthelemy - FR, St. Kitts e Nevis - GB, St. Lucia, St. Maarten - NDH, St. Martin - FR, St. Vincent e Grenadin, Trinidad e Tobago, Turks e Caico - GB)			X		
Ciad		X			
Cile			X	X	
Cina (Hong Kong e Makao)		X	Vedi note		Hong Kong e Makao no rischio malarico. Sospensione 6 mesi.
Colombia		X		X	
Comoros		X			
Congo		X			
Corea		X			
Costa d'Avorio		X			
Costa Rica		X		X	
Ecuador		X		X	
Egitto			X		
El Salvador		X		X	
Emirati Arabi			X		

	Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica. 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
	Eritrea		X	Vedi note		Nessun rischio malarico ad Asmara, sospensione 6 mesi.
	Etiopia		X	Vedi note		Nessun rischio malarico ad Addis Abeba, sospensione 6 mesi.
<b>F</b>	Figgi			X		
	Filippine		X			
<b>G</b>	Gabon		X			
	Gambia		X			
	Georgia		X			
	Ghana		X			
	Giamaica			X		
	Giappone	X				
	Gibuti (Djibouti)		X			
	Giordania	X				
	Guam (USA)			X		
	Guatemala		X		X	
	Guinea		X			
	Guinea Bissau		X			
	Guinea Equatoriale		X			
	Guyana		X		X	
	Guyana Francese		X		X	
<b>H</b>	Haiti		X			
	Hawaii (USA)			X		
	Honduras		X		X	
<b>I</b>	India		X			
	Indonesia		X	Vedi note		Nessun rischio malarico a Bali, nei resort e nelle aree turistiche dell'isola, sospensione 6 mesi.

Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica. 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
Iran		X			
Iraq			X		
Isola Christmas (AUT)			X		
Isole Cocos			X		
Isole Cook (NZ)			X		
Isole Falkland (GB)	X				
Isole Norfolk (AUS)			X		
Isole Salomone		X			
Isola Wake (USA)			X		
Israele	X				
<b>K</b> Kazakistan	X				
Kenia		X			
Kiribati			X		
Kuwait	X				
Kyrgyzstan	X				
<b>L</b> Laos		X			
Lesotho	X				
Libano	X				
Liberia		X			
Libia			X		
<b>M</b> Madagascar		X			
Malawii		X			
Malaysia		X			
Maldive			X		
Mali		X			
Marocco	X				

Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica. 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
Mauritania		X			
Mauritius			X		
Mayotte (F)		X			
Messico		X		X	
Micronesia (Kiribati - Nauru, Isole Marianne, Isole Marshall)			X		
Mongolia	X				
Mozambico		X			
<b>N</b> Namibia		X			
Nepal		X	Vedi note		Nessun rischio nella capitale Kathmandu e nei tipici percorsi himalayani, sospensione 6 mesi.
Nicaragua		X		X	
Niger		X			
Nigeria		X			
Niuer (NZ)			X		
Nuova Caledonia (F)			X		
Nuova Zelanda	X				
<b>O</b> Oman		X			
<b>P</b> Pakistan		X			
Palau			X		
Palestina	X				
Panama		X		X	
Papua - Nuova Guinea		X			
Paraguay		X		X	
Perù		X	Vedi note	X	Nessun rischio a Ica, Lima, Nazca, Cuzco, Machu Picchu e Lago Titicaca. Sospensione 6 mesi.

	Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica. 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
	Pitcairns (GB)			X		
	Polinesia Francese			X		
<b>Q</b>	Quatar	X				
<b>R</b>	Repubblica Centrafricana		X			
	Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire)		X			
	Repubblica Dominicana e Santo Domingo		X			
	Reunion (F)			X		
	Russia					
	Rwanda		X			
<b>S</b>	Sahara Occidentale		X			
	Samoa			X		
	Samoa Americane			X		
	St. Helena (GB)			X		
	St. Pierre e Miquelon	X				
	St. Tomè e Principe		X			
	Senegal		X			
	Seychelles			X		
	Sierra Leone		X			
	Singapore			X		
	Siria	X				
	Somalia		X			
	Sri Lanka			X		
	Stati Uniti	X				No sospensione se disponibile test WNV.
	Sud Africa		X			

	Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica. 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
	Sudan		X			
	Suriname		X		X	
	Swaziland		X			
	Tagikistan		X			
<b>T</b>	Taiwan			X		
	Tanzania		X			
	Thailandia		X			
	Timor Est		X			
	Togo		X			
	Tokelau (NZ)			X		
	Tonga			X		
	Tunisia	X				
	Turchia	Vedi note	X			Nessun rischio malarico nelle principali aree turistiche (Istanbul), nelle zone occidentali e sud-occidentali del Paese, nelle rotte delle crociere, nei resort di Bodrum e nella base aerea US di Incerlik. Sospensione 28 giorni.
	Turkmenistan	X				
	Trinidad e Tobago			X		
	Tuvalu			X		
<b>U</b>	Uganda		X			
	Uruguay			X	X	
	Uzbekistan	X				
<b>V</b>	Vanuatu		X			
	Venezuela		X		X	
	Vietnam		X			



	Paese	28 GIORNI	Paese con aree ad endemia malarica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Paese attraversato dai tropici in assenza di endemia malarica. 6 mesi di sospensione	Paese con Tripanosomiasi Americana (M. di Chagas) endemica. 6 mesi di sospensione con test sierologico negativo	Note
<b>Y</b>	Yemen		X			
<b>Z</b>	Zambia		X			
	Zimbabwe		X			

Fonti:

- **AVIS** (Associazione Volontari Italiani del Sangue) - [www.avis.it](http://www.avis.it)
- **CDC** (Centers for Disease Control and Prevention) - [www.cdc.gov](http://www.cdc.gov)
- **CNS** (Centro Nazionale Sangue) - [www.centronazionalesangue.it](http://www.centronazionalesangue.it)
- **ECDC** (European Centre for Disease Prevention and Control) - [ecdc.europa.eu](http://ecdc.europa.eu)
- **SIMTI** (Società Italiana di Medicina Trasfusionale e Immunoematologia) - [www.simti.it](http://www.simti.it)
- **WHO** (World Health Organization) - World Malaria Report 2016 - [www.who.int](http://www.who.int)